呼吸器感染症に対する Tobramycin 90 mg 点滴静注法の臨床的検討

本島新司・福田 健・牧野荘平

独協医科大学アレルギー内科

(昭和 56 年 12 月 23 日受付)

10名の呼吸器感染症患者に、Tobramycin (TOB) 90 mg を1日2回1時間かけて点滴静注し、その体内動態、臨床効果および安全性を検討した。TOBは6~9日間使用し、投与第1日と最終日に血中濃度を測定した。対象患者の平均年齢は59歳、平均体重は48.5 kg、平均クレアチニンクリアランス(C_{cr})は77 ml/分であった。最高血中濃度(peak)は、点滴終了時の1時間目にあり、第1日では $6.7 \pm 2.0 \mu\text{g/ml}$ (mean $\pm$ S. D.), 最終日では $6.6 \pm 1.0 \mu\text{g/ml}$ であった。半減期($T_{1/2}$)は、第1日目では2.3時間、最終日では2.8時間であった。最終日の $T_{1/2}$ が若干延長しているのは、 $C_{cr} \leq 50$ ml/分の1例の $T_{1/2}$ が最終日に著明な延長を示していたからである。 $C_{cr} > 50$ ml/分の9例に関しては、第1日と最終日の血中濃度曲線はよく一致しており、排泄遅延はみられなかった。one-compartment modelで解析すると、点滴中の血中濃度実測値は予測値より高値で、その差は、点滴終了後に、第1日 $0.8 \pm 1.8 \mu\text{g/ml}$ 、最終日 $0.6 \pm 1.1 \mu\text{g/ml}$ であった。点滴終了後の血中濃度実測値は予測値とかなり一致しており、前記の点を考慮に入れば、one-compartment modelによる解析も臨床的には役立つと考えられた。臨床効果は、10例中6例が有効、4例がやや有効であった。最終日に、TOBの排泄遅延が1名にみられた他には副作用はみられなかった。腎機能が保たれている患者には、TOB 90 mg 1日2回点滴静注法は安全に使用できると考えられるが、腎機能の低下している患者では、頻回な血中濃度の測定が必要であろう。

近年難治性感染症の増加に伴い、aminoglycoside系抗生物質(AGs)の使用頻度が増加している¹⁾。英米では経静脈の投与方法が許可されており、それに基く体内動態の報告も多くみられるが^{2,3)}、日本においては筋注のみ許可されている。しかし、出血傾向のみられる患者や、筋肉の萎縮している患者など、経静脈の投与を必要とする場合が少なくない。一方、呼吸器感染症、とりわけ肺炎の死亡率は未だに高く⁴⁾、特に担癌患者など、免疫機能が低下した患者の肺炎での死亡率は高い⁵⁾ため、より有効な化学療法が求められている。今回われわれは、種々の呼吸器感染症に対し、AGsの一つであるTobramycin(TOB)を、通常量の1.5倍である90 mg点滴静注し、その体内動態、臨床効果および安全性を検討したので報告する。

I. 対象および方法

(1) 対象は、昭和55年11月より昭和56年5月までに独協医科大学アレルギー内科に入院した呼吸器感染症をもつ患者10名、男性が7名、女性が3名であった。年齢は30歳より73歳、平均年齢は59歳であった。体重は39 kgから55 kg、平均体重は48.5 kgであった。疾患の内訳は、肺炎が4名、肺炎と肺膿瘍の合併が1名、肺に基礎疾患をもつものの気道感染症3名、

急性気管支炎2名であった。基礎疾患をもつものは10名中8名であった。

(2) TOBは90 mgを生理食塩液100 mlに溶解し、1時間かけて1日2回点滴静注した。投与期間は6日から9日で、平均7.6日であった。投与第1日と最終投与日の朝の計2回、TOBの血中濃度測定のために採血を行なった。採血は点滴開始前、点滴開始後0.5時間、1時間(即ち点滴終了時)、1.5時間、2.5時間、4.5時間、8時間の各時間に肘静脈より行なった。対象患者10名中6名は、何らかの β -lactam系抗生物質との併用療法であった。また2名は癌に対し化学療法剤を使用していた。

(3) TOB使用開始日より2日間、Creatinine clearance(C_{cr})を24時間法にて測定し、平均値を採用した。 C_{cr} は49 ml/分より135 ml/分で、平均77 ml/分であった。

以上、対象患者の年齢、性、体重、診断名、基礎疾患名、投与日数、併用薬剤および C_{cr} をTable 1に示した。

(4) 血中濃度の測定は、*B. subtilis* ATCC 6633を検定菌とするAgar-well法によった。培地はBacto-antibiotic medium(Difco), pH 8.0を用い、標準曲線作

製には Consera 血清を用いた。

(5) β -lactam 系抗生物質との併用療法を行なった患者においては、血中濃度測定のための採血を行ない、 β -lactamase にて β -lactam 系抗生物質を分解させ、TOB のみの血中濃度を測定した。即ち、ABPC, CBPC, TAPC, PIPC を併用したものでは、Penicillinase (Sigma) を生理食塩水にて 1,000 U/ml の濃度に溶解し、検体の血清 1 ml につき 50 μ l の割に加え、30 分間室温にて incubate して上述の Penicillin を分解させた。また CEZ を併用したものでは、cephalosporinase (Miles) を用い同様の操作を行なった。なお、予備実験にて、この条件下では、400 μ g/ml の上記各抗生物質を完全に分解することを確認した。

(6) TOB の体内動態を one-compartment model にて解析した。第 1 日の血中濃度の排泄相に回帰直線を引き、1 時間における理論上の血中濃度を求める。また同時に、排泄速度恒数 (K_{el}) を直線の傾きより求める。次に、式

$$C_T = \frac{R_{inf}}{V_d \cdot K_{el}} (1 - e^{-K_{el} \cdot T})^6$$

に代入して分布容量 (V_d) を求める。ここで C_T は点滴開始後 T 時間における血中濃度、 R_{inf} は点滴静注速

度、 $T=1$ である。求められた V_d を患者の平均体重で割れば体重 1 kg 当りの分布容量が算出される。次に式

$$\frac{\bar{K}_{el}}{K_{el}} = 1 - f_u \left(1 - \frac{C_{cr}}{C_{cr}} \right)^7$$

に代入して $C_{cr}=100$ ml/分のときの K_{el} を求める。 f_u は尿中未変化体排泄率で、 $f_u=0.9$ とした⁸⁾。 $\bar{K}_{el}$ および C_{cr} は、患者の平均排泄速度恒数および平均クレアチニンクリアランスであり、 $\bar{K}_{el}$ は前述の回帰直線の傾きより求める。 $C_{cr}=100$ を代入すると、 $C_{cr}=100$ ml/分のときの K_{el} が求められる。こうして求められた $C_{cr}=100$ ml/分のときの K_{el} と、各々の患者の C_{cr} を上式に代入すると、逆に各患者の理論上の K_{el} が求められる。これと患者の体重より、第 1 投目の各時間における各患者の血中濃度予測値が求められる。用いる式は、点滴中においては、

$$C_T = \frac{R_{inf}}{V_d \cdot K_{el}} (1 - e^{-K_{el} \cdot T})$$

であり、点滴後においては、

$$C_T = \frac{R_{inf}}{V_d \cdot K_{el}} (1 - e^{-K_{el}}) e^{-K_{el}(T-1)}$$

である⁶⁾。また、最終日の血中濃度は、すでにくり返し投与により steady-state に達しているものとする、

Table 1 Subjects treated with TOB

Case	Name	Age	Sex	B. W.* (kg)	Diagnosis	Underlying disease	Administration		Combined therapy with	C_{cr} **** (ml/min.)
							Daily dose (mg $\times$ time)	Duration (day)		
1	E. S.	60	F	53	Acute bronchitis	(-)	90 $\times$ 2	6	ABPC 4 g/day	63
2	C. H.	73	M	39	Pneumonia	Lung cancer	90 $\times$ 2	9	(-)	49
3	K. K.	55	M	55	Pneumonia	Pulmonary emphysema	90 $\times$ 2	8	(-)	73
4	T. I.	64	M	41	Acute bronchitis	Encephalomyelitis	90 $\times$ 2	8	Prednisolone 20 mg/day	88
5	Y. S.	39	M	49	R. T. I.**	D. P. B.***	90 $\times$ 2	9	CBPC 10 g/day Prednisolone 10 mg/day	106
6	K. N.	73	M	45	R. T. I.	Pulmonary emphysema Bladder tumor	90 $\times$ 2	7	TAPC 1.5 g/day Thiotepa 50 mg/3 w	63
7	H. A.	58	F	55	Pneumonia Lung abscess	Bronchial asthma	90 $\times$ 2	7	CEZ 2 g/day Prednisolone 5 mg/day	64
8	M. O.	52	M	45	R. T. I.	D. P. B.	90 $\times$ 2	8	PIPC 4 g/day Prednisolone 7.5 mg/day	69
9	T. Y.	73	M	53	Pneumonia	Prostatic cancer	90 $\times$ 2	7	Fosfesterol 300 mg/day	63
10	Y. K.	30	F	50	Pneumonia	(-)	90 $\times$ 2	7	CBPC 4 g/day	135
Mean		59		48.5						77

B. W.* : Body weight

R. T. I.** : Respiratory tract infection

D. P. B.*** : Diffuse panbronchiolitis

C_{cr} .**** : Creatinine clearance

$$C_{max} = \frac{90 \cdot (1 - e^{-K_{el}})}{V_d \cdot K_{el} \cdot (1 - e^{-11 \cdot K_{el}})}$$

$$C_{min} = \frac{90 \cdot (1 - e^{-K_{el}}) e^{-11 \cdot K_{el}}}{V_d \cdot K_{el} \cdot (1 - e^{-11 \cdot K_{el}})}$$

$$C_T = C_{max} \cdot e^{-K_{el}(T-1)}$$

で求められる。ここで、 C_{max} は最高血中濃度、 C_{min} は最低血中濃度である。これより各々の時間の血中濃度予測値を求め、これと実測値の比較を行なった。

(7) 臨床効果判定基準は、第27回日本化学療法学会総会(1979)、シンポジウムI、呼吸器感染症の効果判定基準⁹⁾を中心に、松本¹⁰⁾、平賀¹¹⁾の判定基準も参考に、総合的に判定した。効果判定のために、体温は毎日4回、咳嗽、喀痰量および性状、呼吸困難、ラ音は毎日、胸部X線写真、白血球数、CRP、血沈および喀痰培養は使用前および使用後にチェックした。咳嗽は、(-)

なし、(±)わずかにある、(+)1日中あり、(++)睡眠を妨げられる程度、の4段階に分けた。喀痰量は、(-)なし、(+)10 ml/day未満、(++)10 ml/day以上50 ml/day未満、(++)50 ml/day以上100 ml/day未満、(++)100 ml/day以上の5段階に分けた。喀痰性状は、(M)粘性、(MP)粘膿性、(P)膿性に分けた。呼吸困難は、(-)なし、(±)労作時に感じる、(+)安静時にも感じる、(++)起坐呼吸の4段階に分けた。ラ音は、(-)なし、(±)わずかに聞かれる、(+)はっきり聞かれるの3段階に分けた。胸部X線写真は、平賀に従い10段階に分け、3段階以上改善を著明改善、2段階改善を中等度改善、1段階改善を軽度改善とした¹¹⁾。喀痰細菌培養結果が(+)のものは、有意な原因菌とみなさなかった。

(8) 使用前後に、ヘモグロビン、ヘマトクリッ

Table 2 Serum concentration of TOB with 90 mg intravenous drip infusion for 1 hr.

(a) First day

Case	Serum concentration (μg/ml) at hours						
	0	0.5	1	1.5	2.5	4.5	8
1	0	—	7.5	4.8	3.0	—	0.8
2	0	2.0	8.6	4.9	2.6	1.4	0.7
3	0	4.8	7.1	4.8	4.3	1.7	1.1
4	0.3	6.1	7.6	5.2	4.7	1.7	0.8
5	0	1.1	2.8	2.4	2.2	1.1	0.3
6	0	5.9	6.1	5.3	4.7	2.7	1.2
7	0	6.8	8.0	7.3	4.5	2.6	0.9
8	0	0.7	9.7	5.4	3.1	1.8	0.7
9	0	3.2	5.4	4.5	3.9	2.4	—
10	0	2.8	3.9	2.5	2.9	1.3	0.3
Mean ±S. D.	0.03 ±0.1	4.4 ±2.0	6.7 ±2.0	4.7 ±1.3	3.5 ±1.0	1.9 ±0.6	0.8 ±0.3

(b) Last day

Case	Serum concentration (μg/ml) at hours						
	0	0.5	1	1.5	2.5	4.5	8
1	0	6.3	8.1	5.7	—	1.9	0.8
2	1.5	4.6	7.5	6.5	6.5	4.9	3.5
3	0.5	3.6	6.8	4.6	3.1	1.8	1.0
4	0	4.6	7.6	6.0	3.2	2.0	0.7
5	0.3	2.4	4.7	4.5	3.3	1.3	0.3
6	0.6	5.8	6.2	5.0	3.6	1.9	0.7
7	0.2	5.5	7.5	4.7	3.3	1.6	0.6
8	0	3.6	6.5	4.0	2.7	1.7	0.7
9	1.0	4.8	5.6	4.9	3.5	3.1	2.0
10	0.3	4.4	5.7	3.1	1.8	1.1	0.3
Mean ±S. D.	0.4 ±0.5	4.6 ±1.1	6.6 ±1.0	4.9 ±0.9	3.4 ±1.2	2.1 ±1.1	1.1 ±0.9

ト、赤血球数、血小板数、S-GOT、S-GPT、アルカリ・フォスファターゼ、BUN、血清クレアチニン、血清 β_2 -ミクログロブリンを測定した。尿中 β_2 -ミクログロブリンは毎日測定した。 β_2 -ミクログロブリンは、 β_2 -マイクロテスト(シオノギ)を用い測定した。

II. 結 果

(1) Table 2 は第1日と最終日における各患者の血中 TOB 濃度を示している。第1日における Case 1 の 0.5 時間と 4.5 時間、Case 9 の 8 時間、および最終日における Case 1 の 2.5 時間の血中濃度は測定していない。第1日の Case 4 の前値が $0.3 \mu\text{g/ml}$ を示しているのは、3 日前に筋注した SM がいまだに血中に残っていたものと思われる。血中濃度の peak は、点滴終了時の1時間にあり、第1日では $6.7 \pm 2.0 \mu\text{g/ml}$ (mean $\pm$ S.D.), 最終日では $6.6 \pm 1.0 \mu\text{g/ml}$ であった。8 時間では、第1日 $0.8 \pm 0.3 \mu\text{g/ml}$ 、最終日 $1.1 \pm 0.9 \mu\text{g/ml}$ まで低下していた。最高血中濃度 (peak) が $10 \mu\text{g/ml}$ を超えたものもなく、また、点滴前の血中濃度 (trough) が $2 \mu\text{g/ml}$ を超えたものもなかった。

(2) Fig. 1 は、得られた血中濃度の経時的变化をグラフにし、mean $\pm$ S.D. で表わしたものである。点滴前の血中濃度のみ、第1日と最終日に有意差を認めた ($P < 0.05$, t-検定) が、その他の時間には有意な差は認められなかった。半減期 ($T_{1/2}$) は第1日 2.3 時間、最終日 2.8 時間であり、最終日には若干の延長をみた。

(3) Fig. 2 は、TOB の血中濃度の経時的变化を、 C_{cr} により分けて描いたものである。Fig. 2(a) は $C_{cr} > 80 \text{ ml/min}$ 、Fig. 2(b) は $50 < C_{cr} \leq 80 \text{ ml/min}$ 、Fig. 2(c) は $C_{cr} \leq 50 \text{ ml/min}$ の患者の血中濃度を示している。 $C_{cr} > 80 \text{ ml/min}$ の群の血中濃度の peak は、第1日 4.8 ± 2.1

Fig. 1 Serum concentrations of TOB with 90 mg intravenous drip infusion for 1 hr.

$\mu\text{g/ml}$ (mean $\pm$ S.D.), 最終日は $6.0 \pm 1.2 \mu\text{g/ml}$ であった。 $T_{1/2}$ は第1日 2.1 時間、最終日 1.9 時間であった。 $50 < C_{cr} \leq 80 \text{ ml/min}$ の群の peak は、第1日 $7.3 \pm 1.4 \mu\text{g/ml}$ 、最終日 $6.8 \pm 0.8 \mu\text{g/ml}$ であった。 $T_{1/2}$ は第1日 2.5 時間、最終日 2.6 時間であった。 $C_{cr} \leq 50 \text{ ml/min}$ 以下の1名においては、peak は第1日 $8.6 \mu\text{g/ml}$ 、最終日 $7.5 \mu\text{g/ml}$ であった。 $T_{1/2}$ は第1日 2.1 時間、最終日 6.0 時間と著明な延長をみた。 $C_{cr} > 50 \text{ ml/min}$ の患者においては、第1日と最終日の血中濃度の曲線はよく一致していた。

(4) Fig. 1 より求められた $K_{e1} = 0.299/\text{hr.}$ 、 $V_d = 0.281/\text{kg}$ であった。これより $C_{cr} = 100 \text{ ml/min}$ のときの

Fig. 2 Serum concentration of TOB divided by C_{cr} . (a: $C_{cr} > 80 \text{ ml/min}$. b: $50 \text{ ml/min} < C_{cr} \leq 80 \text{ ml/min}$. c: $C_{cr} \leq 50 \text{ ml/min}$).

Table 3 Clinical effects of TOB

No.	Diagnosis	Fever	Cough	Sputum amount	Sputum character	Dyspnea	Rates	Chest X-ray	WBC (mm ⁻³)	CRP (hr. ⁻¹)	ESR (hr. ⁻¹)	Isolated organism (sputum)	PaO ₂ (mmHg) (room air)	Effect		Side effect
														Bacte-rial	Clinical	
1	Acute bronchitis	Before 37.8 After	+	-	-	-	-	No changes	5,900 4,900	## +	94 93	Normal flora N.D.	N.D.	Unvaluable	Fair	-
2	Pneumonia	Before 38.0 After	+	+	Bloody M.**	±	+	Moderately improved	4,900 4,300	### +	30 21	Normal flora Normal flora	50(O ₂ 5l) 162(O ₂ 4l)	Unvaluable	Good	-
3	Pneumonia	Before — After	+	+	P.* M.	-	+	Moderately improved	4,900 4,300	+ -	30 18	<i>S. pneumoniae</i> (##) Normal flora	70 71	Good	Good	-
4	Acute bronchitis	Before 37.4 After	++	+	P. M.P.***	±	+	No changes	10,200 11,500	+ +	53 35	<i>E. coli</i> (##) <i>Klebsiella</i> (##) <i>P. aeruginosa</i> (##)	118(O ₂ 2.5l) 95(O ₂ 1l)	Replaced	Fair	-
5	RTI	Before 37.2 After	+	##	P. M.P.	+	+	No changes	14,100 8,700	+ -	12 4	<i>H. influenzae</i> (##) <i>P. aeruginosa</i> (##) <i>P. aeruginosa</i> (+)	41 54	Reduced	Good	-
6	RTI	Before — After	+	##	M.P. M.	-	+	No changes	3,100 2,800	+ +	33 20	<i>Serratia</i> (+) Normal flora	52 68	Unvaluable	Fair	-
7	Pneumonia Lung abscess	Before — After	±	+	M. M.	-	-	Moderately improved	8,000 4,900	+ -	50 15	<i>Enterobacter</i> (##) Normal flora	N.D.	Good	Good	-
8	RTI	Before 37.6 After	++	##	P. M.P.	±	+	No changes	7,700 6,600	## -	58 45	<i>P. aeruginosa</i> (##) <i>P. aeruginosa</i> (##)	51 55	Poor	Fair	-
9	Pneumonia	Before — After	+	##	M.P. M.P.	+	±	Markedly improved	9,500 8,200	N. D.	55 65	GNR (+) Normal flora	N.D.	Unvaluable	Good	-
10	Pneumonia	Before 37.4 After	+	+	M.P.	±	-	Moderately improved	9,900 6,300	+ -	53 16	<i>H. influenzae</i> (##) Normal flora	N.D.	Good	Good	-

P.*: Purulent

M.**: Mucous

M.P.***: Mucopurulent

$K_{el}=0.376/hr$ であり、 $T_{1/2}=1.84$ 時間であった。これより前述の式を用いて血中濃度の予測値を求めた。

(5) Fig. 3 は、血中濃度の実測値と予測値との差を表わしたものである。(実測値-予測値)は、点滴前、点滴開始後 0.5 時間、1 時間、1.5 時間、2.5 時間、4.5 時間、8 時間の各時間において、第 1 日では、 $0 \pm 0.1 \mu g/ml$ (mean $\pm$ S. D.), $1.2 \pm 2.1 \mu g/ml$, $0.8 \pm 1.8 \mu g/ml$

ml, $-0.3 \pm 1.3 \mu g/ml$, $-0.3 \pm 1.2 \mu g/ml$, $-0.3 \pm 0.8 \mu g/ml$, $-0.1 \pm 0.4 \mu g/ml$ であった。また最終日においては、各々の時間において、 $0.1 \pm 0.3 \mu g/ml$, $1.2 \pm 1.2 \mu g/ml$, $0.5 \pm 1.1 \mu g/ml$, $-0.4 \pm 0.7 \mu g/ml$, $-0.5 \pm 0.6 \mu g/ml$, $-0.2 \pm 0.6 \mu g/ml$, $-0.2 \pm 0.6 \mu g/ml$, であった。

(6) Table 3 に臨床効果を示した。臨床的には、有効 6 名、やや有効 4 名、有効率 60% であった。細菌学的には、有効 3 名、減少 1 名、菌交代 1 名、無効 1 名、判定不能 4 名、であった。臨床所見上副作用は認められなかった。

(7) Fig. 4 は、TOB 使用前後に各検査 data を表わしたものである。最終日に TOB の排泄遅延をみた Case 2 において、血清 β_2 -ミクログロブリン濃度が、 $3.6 mg/l$ より $4.5 mg/l$ に上昇していた。その他には著明な変化はみられなかった。Case 2 の血清クレアチニン値は、前後とも $1.1 mg/dl$ であった。アルカリ・フォスファターゼの異常高値は Case 9 で、これは前立腺癌の骨転移によるものである。ただし Case 2, 3, 6 は赤血球を算定しなかった。

(8) Fig. 5 は、Case 9 を除く尿中 β_2 -ミクログロブリン排泄量を表わしたものである。1 日尿中排泄量は、 $0.03 mg/day$ 程度のものから、 $3 mg/day$ 以上のものまでみられた。TOB 排泄の遅延を示した Case 2 に

Fig. 3 Differences between obtained and predicted serum concentration of TOB under the condition of one-compartment model, $f_u=0.9$ and $V_d=0.28 l/kg$

Fig. 4 Laboratory data before and after treatment with TOB

Fig. 5 Daily urinary secretion of β_2 -microglobulin

おいては、常に 3 mg/day 以上の排泄をみた。しかし、最終日において TOB の排泄遅延をみなかった例においても、かなりの量の β_2 -ミクログロブリン排泄を認めたものも存在した。

III. 考 察

呼吸器感染症は、国民死亡原因の重要な位置を占め、特に老年者および担癌患者において重要である^{4,5}。起病因菌についてもその変遷がいわれており、中川は、肺炎の原因菌として、1969 年以後 *Klebsiella*, *Enterobacter*, *E. coli*, *P. aeruginosa* などグラム陰性桿菌の増加を示し¹²。真下も同様のことを示している¹³。また、近年注目されているびまん性汎細気管支炎においては、*P. aeruginosa* の感染が必発であることも知られている¹⁴。一方、斉藤らにより、最近の AGs の使用増加が示され¹、また、藤井も全国統計により、GM, DKB, AMK など抗緑膿菌 AGs の使用増加を示している¹⁵。そしてこの現象は起炎菌の変遷と関係があると思われる。AGs は、その抗菌力の強さの反面、治療域血中濃度が狭く、特に腎毒性および聴器毒性のために注意して使用されるべきである¹⁶。AGs の腎・聴器毒性は、最高血中濃度 (peak) が 10~12 $\mu\text{g/ml}$ 以上になると出現しやすいといわれており⁸⁾¹⁷⁾¹⁸、また、最低血中濃度 (trough) が 2 $\mu\text{g/ml}$ 以上になると出現しやすいともいわれている¹⁹。しかし、RUBENIS²⁰ や西野²¹ の *in vitro* の実験により、GM においては、菌と GM の接触時間よりも、濃度依存性に殺菌効果が得られることが示されている。そこでわれわれは、今後いっそう使用量の増加が考えられ、また、副作用なしに治療効果の高い投与

法の求められている AGs の一つである TOB を、90 mg 点滴静注し、その血中濃度、臨床効果および副作用を検討した。

TOB の経静脈的投与方法に関しては、すでにいくつかの報告がみられている。斉藤は、健康者に 60 mg を 1 時間で点滴静注し、peak 5.0 $\pm$ 0.8 $\mu\text{g/ml}$, $T_{1/2}$ 44 分を得ており、血中濃度曲線は筋注と類似のパターンをとると結論している²²。島田らは 1 mg/kg を老年者に 1 時間で点滴静注し、peak 4.5 $\pm$ 0.6 $\mu\text{g/ml}$, $T_{1/2}$ 164 分であったと報告している²³。Lode らによれば、健康人に 1 mg/kg を 1 時間かけて点滴静注し、peak は 4.86 $\pm$ 0.90 $\mu\text{g/ml}$ であったとしている²。われわれは 90 mg を一様に点滴静注しており、これは 1.6~2.3 mg/kg になる。われわれの得られた peak が、第 1 日 6.7 $\pm$ 2.0 $\mu\text{g/ml}$ 、最終日 6.6 $\pm$ 1.0 $\mu\text{g/ml}$ とやや高めなのは、体重 1 kg 当りの投与量の違いによるものと考えられる。しかし、peak が 10 $\mu\text{g/ml}$ 以上、または trough が 2 $\mu\text{g/ml}$ 以上のものはみられなかった。一方、 $T_{1/2}$ は、われわれの結果では第 1 日において 138 分であり、島田らの老年者における 164 分より若干短い、斉藤の健康者における 44 分より長い。この違いは、おそらく C_{cr} の違いによると思われる。島田らの対象の C_{cr} は平均 57 ml/分であり、われわれの対象の C_{cr} は平均 77 ml/分である。斉藤の報告には明記されていないが、対象が若干健康者であるので、おそらくこれより高い C_{cr} 値を示すものと思われる。

次にわれわれは、 C_{cr} により 3 群に分けて血中濃度曲線を描いてみた。peak は、 C_{cr} 値が高いほど低く、 C_{cr} 値が低いほど高くなり、 $T_{1/2}$ は逆に、 C_{cr} 値が高いほど短い傾向がみられた。これは斉藤らの結果²⁴と同じである。 $C_{cr} > 50$ ml/分以上の群においては、第 1 日と最終日の血中濃度曲線は非常によく一致していた。即ち、この程度までの腎機能であれば、1 回 90 mg 1 日 2 回投与では蓄積もみられず、安全に使用できるのではないかとと思われる。しかし $C_{cr} \leq 50$ ml/分の 1 例においては、peak は 10 $\mu\text{g/ml}$ 以下、かつ trough は 2 $\mu\text{g/ml}$ 以下であったが、最終日において著明な排泄の遅延を認めた。これは裏返せば、TOB 使用にて腎機能の悪化がもたらされたと考えるべきで、SCHENTAG²⁵ らのいうように、腎障害は必ずしも血中濃度のみでは予測できず、腎組織内の薬物濃度が大きな要因なのかもしれない。われわれの対象中、排泄の遅延をみた Case 2 は、TOB 使用前後も血清クレアチニン値は 1.1 mg/dl であり、BUN も著変がみられなかった。CULTER らは、血清クレアチニン値より GM の投与量を計算することを提案している²⁶が、やはり投与量は斉藤ら²⁴の指摘ど

おり、 C_{cr} 値および体重より算出されるべきであろう。

AGs の体内動態は、two-compartment model に従うことが報告されているが²⁸⁾、これによる解析は大変煩雑である。そこでわれわれは、one-compartment model にて解析して、どれだけ臨床的に利用しうるかを検討した。one-compartment model にて解析すると、点滴開始後、0.5 時間および1時間において、実測値が予測値より高く、それ以後の時間においては、実測値は予測値とかなりよく一致していた。これは、0.5 時間および1時間においては、TOB の peripheral compartment への拡散が不充分のために、central compartment 内の濃度が高くなっていると理解される。peripheral compartment への拡散が充分行なわれた時点においては、両 compartment 内の濃度はほぼ同一になるために、one-compartment model で扱っても誤差はあまり生じないと考えられる。ゆえに、peripheral compartment への拡散が充分行なわれる以前においては、実測値と予測値との違いの程度を考慮に入れておけば、one-compartment model にて解析した予測値も充分役立つと思われた。予測値が実測値とかなり一致することは、山作らによっても報告されており²⁷⁾、DVORCHIK らも同様のことを述べている²⁹⁾。しかし、RAMIES らは、腎機能低下患者においては、 C_{cr} が GM の血中濃度予測のよい指標とはなり難いことを報告しており、頻回な血中濃度の測定を勧めている²⁹⁾。BARZA らも同様のことを述べている³⁰⁾。血中濃度の測定法としては、従来より Bioassay 法が主流であったが、これは測定に時間を要し、血中濃度をモニターしながら投与量を決定するには不適である。これからは、迅速な測定法として、酵素抗体法³¹⁾や高速液体クロマトグラフィー法³²⁾が広く用いられることになろう。

今回のわれわれの治療成績は、TOB 単独療法のものでは4例中3例が有効(有効率75%)、何らかの β -lactam 系抗生物質との併用療法を行なったものは6例中3例が有効(有効率50%)で、合わせると10例中6例が有効(有効率60%)であった。TOB を点滴静注法にて呼吸器感染症に使用した報告は他にいくつか見られる。斎藤らによれば、TOB 60 mg を1日3回点滴静注し、有効率は66.7%であった³³⁾。伊藤によれば、90 mg を1日2回点滴静注し、有効率は70%であり³⁴⁾、平賀らは、*P. aeruginosa* による慢性呼吸器感染症に、1日180~240 mg を点滴静注し、有効率は46.7%だったとしている¹⁾。また厚井らによれば、TOB+PCs+CEPs の併用療法にて、肺炎には4例全例に有効だったとしている³⁵⁾。AGs の点滴静注法が、筋注法にどれだけ優るものなのか、また大量投与が、通常量投与に比べ

てどれだけ臨床効果的に優れているのか、そして副作用の点はどうか、に関しては、これからまた症例を増やし検討していかねばならないと考える。

今回、副作用は、TOB の排泄遅延をみた1例において、血清 β_2 -ミクログロブリンが3.5 mg/l より4.5 mg/l に上昇した他には著明なものはみられなかった。TOB 90 mg 点滴静注は、腎機能が保たれていれば安全に使用できると考えられた。点滴静注と筋注の副作用の差について、大谷らは、動物実験上では1時間の点滴静注と筋注は副作用に差はないと述べているが³⁶⁾、なお検討が必要であろう。

近年 β_2 -ミクログロブリンが radioimmunoassay により測定できるようになった。高杉らは、尿中 β_2 -ミクログロブリンは尿細管障害の検出に適しているとしており³⁷⁾、SCHENTAG らは、血清クレアチニンの上昇に先立って尿中 β_2 -ミクログロブリンが上昇すると述べている³⁸⁾。われわれの症例においては、TOB 排泄遅延をきたした Case 2 は、尿中 β_2 -ミクログロブリンが常に3.0 mg/day 以上であったが、尿中 β_2 -ミクログロブリンが高くとも TOB の排泄遅延をみなかった症例もあった。これは、投与日数が短いために腎機能障害をきたさずにすんだとも考えられる。 β_2 -ミクログロブリンは種々の状態にて増加することが知られているが³⁹⁾、AGs 投与において、充分注意をはらうべき患者を知るために役立つように思われた。

最後に、TOB の血中濃度と、 β_2 -ミクログロブリンの測定に甚大な御協力を下さった塩野義製薬研究所の方々に感謝する。

なお、本論文の要旨は、第28回日本化学療法学会東日本支部総会にて発表した。

文 献

- 1) 斎藤 厚, 重野芳輝, 中富昌夫, 広田正毅, 那須勝, 原 耕平, 清水龍夫: 長崎大学附属病院における最近6年間の抗生剤使用情況。Chemothrapy 28: 1201~1206, 1980
- 2) LODE, H.; B. KEMMELICH & P. KOEPE: Comparative clinical pharmacology of gentamicin, sisomicin and tobramycin. Antimicrob. Agents & Chemoth. 8: 396~401, 1975
- 3) GILLET, A. P.; R. H. FALK, J. ANDLEWS, R. WISE & V. MILIKAN: Rapid intravenous injection of tobramycin: suggested dosage schedule and concentration in serum. J. Infect. Dis. 134(supp.): 110~113, 1976
- 4) 浦山京子, 島田 馨, 稲松孝思: 老年者の感染症。日本臨床 39: 593~596, 1981
- 5) 前沢 祥, 大平貞雄, 佐久間正義, 松岡 茂, 入野田侑宏, 横山正和, 涌井 昭, 渡部一弘, 斎藤達雄: 癌化学療法下における感染症の臨床的研

- 究。Chemotherapy 29: 902~918, 1981
- 6) 石崎高志: 薬物投与設計理論のベッドサイドへの応用 (1)。治療 59: 2171~2178, 1977
 - 7) GIUSTI, D. L. & W. L. HAYTON: Dosage regimen adjustment in renal impairment. Drug Intell. & Clin. Pharm. 7: 382~387, 1973
 - 8) JACKSON, E. A. & D. C. Mc LEOD: Pharmacokinetics and dosing of antimicrobial agents in renal impairment, part 1. Amer. J. Hosp. Pharm. 31: 36~52, 1974
 - 9) 塩田憲三, 斎藤 玲, 三木文雄, 原 耕平, 可部順三郎: 第 28 回日本化学療法学会総会 (1980) シンポジウム II, 呼吸器感染症の効果判定基準。Chemotherapy 28: 1414~1426, 1980
 - 10) 松本慶蔵, 斎藤 玲, 横山紘一, 楠 正, 小里芳顕: 細菌性肺炎の治療効果評価方式に関する研究。臨床薬理 8: 155~168, 1977
 - 11) 平賀洋明, 菊地弘毅, 中橋 勝: 緑膿菌による難治性慢性呼吸器感染症に対する tobramycin の点滴静注法の臨床的研究。Jap. J. Antibiotics 34: 1244~1254, 1981
 - 12) 中川圭一: 第 20 回日本化学療法学会東日本支部総会, 急性肺炎の臨床。Chemotherapy 22: 198~201, 1974
 - 13) 真下啓明編: 肺炎のすべて, 細菌性肺炎の変貌 (真下啓明)。119~127 頁, 南江堂, 1976
 - 14) 本間日臣: びまん性汎細気管支炎 (びまん性呼吸細気管支炎)。日本内科学会雑誌 65: 645~659, 1976
 - 15) 藤井良知: 化学療法剤使用の現況。最新医学 32: 1439~1445, 1977
 - 16) 上田 泰, 真下啓明編: 今日の化学療法, アミノ配糖体系抗生剤 (上田 泰)。310~338 頁, ライフ・サイエンス, 1980
 - 17) HEWITT, W. L.: Refrctions on the clinical pharmacology of gentamicin. Acta. Pathol. Microbiol. Scand. (B) 81(Suppl. 241): 151~156, 1973
 - 18) 大越正秋: アミノグリコシド系抗生物質の現況。最新医学 34: 1487~1494, 1979
 - 19) DAHLGREN, J. D.; E. T. ANDERSON & W. L. HEWITT: Gentamicin blood levels: a guide to nephrotoxicity. Antimicrob. Agents & Chemoth. 8: 58~62, 1975
 - 20) RUBENIS, M.; V. M. KOZIJ & G. G. JACKSON: Laboratory studies on gentamicin. Antimicrob. Agents & Chemoth. 3: 153~156, 1963
 - 21) 西野武志: 化学療法剤の投与方法に関する基礎的研究。最新医学 32: 1491~1496, 1977
 - 22) 斎藤 玲: Tobramycin 点滴静注時の体内動態。Jap. J. Antibiotics 33: 989~993, 1980
 - 23) 島田 馨, 稻松孝思, 浦山京子: 老年者における Cefalothin, cefamandole, 6059-S, tobramycin の薬動学的検討。最新医学 36: 1006~1012, 1981
 - 24) 斎藤 篤, 山路武久: 腎不全における抗生剤療法——薬動学的解析による投与方法開発の試み——。最新医学 32: 1505~1509, 1977
 - 25) SCHENTAG, J. J.; T. J. CUMBO, W. J. JUSKO & M. E. PLAUT: Gentamicin tissue accumulation and nephrotoxic reactions. JAMA 240: 2067~2069, 1978
 - 26) CULTER, R. E.; A. M. GYSELYNCK, W. P. FLEET & A. W. FORREY: Correlation of serum ceftazidime concentration and gentamicin half-life. JAMA 219: 1037~1041, 1972
 - 27) 山作房之輔, 鈴木康稔: アミノ配糖体系抗生剤の薬動学的研究 1, Gentamicin, Dibekacin, Tobramycin について。Chemotherapy 29: 583~588, 1981
 - 28) DVORCHIK, B. H. & E. S. VESELL: Significance of error associated with use of the one-compartment formula to calculate clearance of thirty-eight drugs. Clin. Pharmacol. Ther. 23: 617~623, 1978
 - 29) RAMIES, H.; G. HITZENBERGER, I. JASCHEK & W. GRANINGER: Ist die endogene Kreatinin-Clearance eine geeignete Basis für die Berechnung von Eliminationshalbwertszeiten des Gentamicins? Dtsch. Med. Wschr. 105: 1650~1654, 1980
 - 30) BARZA, M.; R. B. BROWN, D. SHEN, M. GIBALDI & L. WEINSTEIN: Predictability of blood levels of gentamicin in man. J. Infect. Dis. 132: 165~174, 1975
 - 31) WILLS, P. J. & R. WISE: Rapid, simple enzyme immunoassay for gentamicin. Antimicrob. Agents & Chemoth. 16: 40~42, 1979
 - 32) 林 康之, 西園時 克: 体液内濃度測定における高速液体クロマトグラフィーおよび酵素抗体法の応用。日本臨床 39: 115~120, 1981
 - 33) 斎藤 玲, 菊入 剛, 富沢磨須美, 氏家 昭, 木下与四男: Tobramycin 点滴静注投与における臨床的研究。Jap. J. Antibiotics 34: 1255~1262, 1981
 - 34) 伊藤亜司: 呼吸器科領域感染症に対する Tobramycin 点滴静注の使用経験。基礎と臨床 15: 3731~3742, 1981
 - 35) 厚井文一, 頼 敏裕, 依光聖一, 時岡正明, 北川中行, 高橋 功, 喜多嶋康一, 木村郁郎, 安井晃栄, 吉沢圭子: アミノ配糖体の大量点滴静注法を中心とした 3 剤併用投与の有効性——急性白血病併発感染症の治療への応用——。Chemotherapy 28: 28: 1295~1303, 1980
 - 36) 大谷 巖, 大槻好正, 相川 通, 竹中正之, 尾股丈夫, 大内 仁, 斎藤武郎, 仲田武実, 鬼海庄一郎, 安部正弘: アミノ配糖体系薬剤の点滴静注による聴器・腎毒性に関する実験的研究。Chemotherapy 28: 129~137, 1980
 - 37) 高杉昌幸, 広田達哉, 長谷川 治, 木村耕太郎, 坂本 茂, 富永喜久男, 井林 博: 腎疾患における血中および尿中 β_2 -microglobulin。日本腎臓

学会誌 20 : 1107~1117, 1978

- 38) SCHECTAG, J. J.; T. A. SUFTIN, M. E. PLAUT & W. J. JUSKO : Early detection of aminoglycoside nephrotoxicity with beta-2-microglobulin. J. Med. 9 : 201~210, 1978

39) 馬場茂明, 水野信彦, 高瀬重暉 : β_2 -microglobulin. Medicina 17 : 530~533, 1980

CLINICAL STUDIES ON INTRAVENOUS DRIP INFUSION METHOD OF 90 mg TOBRAMYCIN(TOB) FOR RESPIRATORY INFECTIONS

SHINJI MOTOJIMA, TAKESHI FUKUDA and SOHEI MAKINO

Department of Medicine and Clinical Immunology, Dokkyo University School of Medicine

The serum concentrations following intravenous drip infusion of 90 mg TOB for 1 hour, its clinical effects for respiratory tract infections and side effects were studied. The average age, body weight and creatinine clearance(C_{cr}) of the 10 subjects were 59 years, 48.5 kg and 77 ml/min, respectively. Serum concentrations were determined on the first and last day of TOB administration. Peak serum concentrations of the first and last day were $6.7 \pm 2.0 \mu\text{g/ml}$ (mean $\pm$ S. D.) and $6.6 \pm 1.0 \mu\text{g/ml}$, respectively. The half lives of TOB of the first and last day were 2.3 hours and 2.8 hours, respectively. In 9 subjects with C_{cr} more than 50 ml/min, the serum concentration curves of the last day were similar to that of the first day. But in one subject with C_{cr} less than 50 ml/min, the half life of the last day was markedly prolonged. The actual serum concentrations during drip infusion were higher than that calculated by one-compartment model analysis, though they fitted well to calculated values after drip infusion. So, one-compartment model analysis was considered to be useful to predict serum concentrations in clinical practice. The clinical effect of 6 cases was evaluated good and that of 4 cases was fair. No side effects were observed except one case with prolonged half life. we conclude that drip infusion of 90 mg TOB is safe and effective in patients with normal and slightly reduced renal function, but serum concentrations should be often determined in patients with impaired renal function.