

ERRATA

- 西野武志他 2 名 : Lenampicillin (KBT-1585) に関する細菌学的評価。 : Chemotherapy 32 (S-8) : 20-29, (1984)  
 p. 27 Table 6 ED<sub>50</sub> 0.70→1.24, 3.00→2.35, 1.80→1.58, 1.50→1.00, 3.00→2.45, 1.20→1.64
- 荻野文雄他 5 名 : Lenampicillin hydrochloride (KBT-1585) のマウス, ラットおよびイヌにおける急性毒性試験。  
 : Chemotherapy 32 (S-8) : 31-34, (1984)  
 p. 31 右段下から 1 行目 516→562  
 p. 33 右段下から 24 行目 Bacampicillin<sup>1)</sup>, Talampicillin<sup>2)</sup> → Bacampicillin<sup>3)</sup>, Talampicillin<sup>4)</sup>
- 荻野文雄他 5 名 : Lenampicillin hydrochloride (KBT-1585) のラット経口投与による 3 カ月亜急性毒性試験。  
 Chemotherapy 32 (S-8) : 57-71, (1984)  
 p. 59 右段上から 17 行目 20→18  
 p. 71 下から 6 行目 cecum→and
- 平川公昭他 5 名 : Lenampicillin hydrochloride (KBT-1585) のビーグル犬 3 カ月間経口投与による 亜急性毒性試験。  
 : Chemotherapy 32 (S-8) : 72-108, (1984)  
 p. 73 右段上から 4 行目 消化管, 膀胱→消化管, 脾, 膀胱  
 p. 76 Table 2 300mg/kg RBC の 1M 683→688
- 加島正明他 3 名 : Lenampicillin hydrochloride (KBT-1585) のビーグル犬経口投与による慢性毒性試験ならびに回復試験。  
 : Chemotherapy 32 (S-8) : 109-129, (1984)  
 p. 115 Table 2-3 MCH の Rec の F の control 27.50→23.00  
 p. 120 Table 3-4 Urea Nitrogen 3M の F の 150mg/kg 10.07→20.07  
 p. 121 Table 3-5 K 3M の F の 150mg/kg ±0.2→±0.16  
 p. 124 Table 5-1 Adrenal 相対重量の 300mg/kg Right 5.61→4.80 Left 4.61→5.61
- 田内清憲他 5 名 : Lenampicillin hydrochloride (KBT-1585) のラットにおける胎仔の器官形成期投与試験。  
 : Chemotherapy 32 (S-8) : 130-145, (1984)  
 p. 137 Table 5 Sex ratio, 500mg の 121→125, 68/56→69/55
- 栗田則男他 3 名 : Lenampicillin hydrochloride (KBT-1585) のラットおよびイヌにおける吸収, 分布および排泄。  
 : Chemotherapy 32 (S-8) : 181-188, (1984)  
 p. 185 Table 4 Bacampicillin, Urin, 0-6 hr 値 10.9±9.4→10.6±9.4
- 山手丈至他 7 名 : Lenampicillin hydrochloride (KBT-1585) のラットにおける亜急性毒性および回復試験。  
 : Chemotherapy 32 (S-8) : 35-56, (1984)  
 p. 40 Table 2 Male KBT-1585 1,000 の行 MCHC の列 31.8→31.9  
 p. 41 Table 3 Male ABPC の行 T.Chol の列 38.5\*\*\*→38.4\*\*\*  
 Female KBT-1585 1,000 の行 Cl<sup>-</sup> の列 103→102  
 p. 43 Table 5 Spleen→Liver, Liver→Spleen  
 Female KBT-1585 400 の行 上段 0.423→0.423\*, 0.434→0.434\*, 0.857→0.857\*  
 1,000 の行 上段 0.427→0.427\*, 0.862→0.862\*  
 2,500 の行 上段 0.435\*→0.435\*\*
- BAPC 上段 0.361→0.361\*

Control

ex	Drug	Groups (mg/kg)	Cases	Liver	Spleen	Kidney			Heart	Lungs	Adrenal glands			Thymus	Thyroid	Pituitary	Cecum	Testes or ovaries			Pre- state gland	Brain
						Left	Right	Total			Left	Right	Total					Left	Right	Total		
		0	12	3.29 0.57	0.243 0.028	0.402 0.035	0.406 0.038	0.808 0.071	0.381 0.031	0.488 0.026	0.0191 0.0018	0.0183 0.0019	0.0374 0.0031	0.226 0.041	0.0105 0.0015	0.0059 0.0008	1.89 0.33	0.0255 0.0026	0.0256 0.0052	0.0511 0.0071	0.260 0.050	0.928 0.060
		0	12	3.29 0.53	0.243 0.024	0.401 0.026	0.405 0.032	0.806 0.056	0.380 0.026	0.488 0.021	0.0191 0.0019	0.0183 0.0018	0.0374 0.0032	0.226 0.041	0.0105 0.0019	0.0059 0.0006	1.90 0.37	0.0255 0.0025	0.0256 0.0049	0.0510 0.0066	0.261 0.056	0.928 0.064

中島光好他 2 名 : Lenampicillin (KBT-1585) の臨床第一相試験。 : *Chemotherapy* 32 (S-8) : 189-208, (1984)

- p. 189 左段下から 2 行目 である<sup>1)</sup>。→である<sup>2)</sup>。
- p. 192 左段下から 6 行目 30→36→31→36
- p. 192 左段下から 8 行目 12→18→14→9→12→18→24
- p. 195 右段上から 3 行目 12.51%→14.09%
- p. 195 右段上から 13 行目 であつたり。→であつた<sup>3)</sup>。
- p. 198 Fig. 8 2 時間値以降の曲線→破線と実線いれかわる。
- p. 198 Fig. 9 title non-fasted→fasted
- p. 199 Table 7-1 1 S. S. 4.81→12.74, 0.75→1.92
- p. 199 Table 7-1 Mean 12.51→14.09, 2.42→2.65
- p. 199 Table 7-1 ±S. D. 6.08→4.36, 1.58→1.34
- p. 201 Table 8-1 1 H. M. 798.12→798.72, 110.97→102.45
- p. 201 Table 8-1 Mean 476.36→476.46, 117.40→115.98
- p. 201 Table 8-1 ±S. D. 177.15→177.36, 23.24→23.96
- p. 203 Table 8-3 1 H. M. 94.65→126.45
- p. 203 Table 8-3 4 K. T. 488.67→448.67
- p. 203 Table 8-3 Mean 127.34→132.64, 285.66→278.99
- p. 203 Table 8-3 ±S. D. 30.80→26.48, 143.27→132.45
- p. 204 Table 8-4 6 M. A. 478.18→479.18
- p. 204 Table 8-4 Mean 412.65→412.81
- p. 204 Table 8-4 ±S. D. 72.27→72.45
- p. 205 Table 8-5 1 H. M. 139.98→138.45
- p. 205 Table 8-5 Mean 133.21→132.95
- p. 205 Table 8-5 ±S. D. 25.91→25.84

中山一誠他 5 名 : 外科領域における新経口 Ampicillin の prodrug Lenampicillin (KBT-1585) の抗菌力, 吸収, 排泄, 代謝および臓器移行性について。 : *Chemotherapy* 32 (S-8) : 428-443, (1984)

- p. 438 Table 15 Mean の行 Recovery の列 25.67%→22.2%

植田省吾他 5 名 : 尿路感染症に対する Lenampicillin (KBT-1585) の臨床的検討。 : *Chemotherapy* 32 (S-8) : 629-642, (1984)

- p. 631 Table 1-2 No. 11 14th day S. intormedius→S. intermedius
- p. 634 左段 1 行目 25.0 μg→50.0 μg

森島 丘他 1 名 : 口腔外科領域における Lenampicillin (KBT-1585) の臨床的検討。 : *Chemotherapy* 32 (S-8) : 752-756, (1984)

- p. 752 11 行目 S-GPT→S-GOT, S-GPT
- p. 753 右段 2 行目 25 例→23 例
- p. 753 右段 4 行目 S-GPT の軽度上昇 (42 KU)→S-GPT, S-GPT の軽度上昇 (32, 42 KU)
- p. 754 Table 4 No. 11 incision→incision, RCT
- p. 756 右段 22 行目 α-Streptococcus intermedius→α-Streptococcus, Streptococcus intermedius
- p. 756 右段 4 行目 S-GPT→S-GOT, S-GPT