

正 誤 表

Fleroxacin 論文特集号 Chemotherapy 38(S-2)1990

著者名	タイトル	該当箇所	誤	正
相島 博 他10名	新キノロン系抗菌剤Fleroxacinのマウス、 ラット及びびイヌにおける急性毒性試験	P139 Table 3-1 Dose 160mg/kg, Animal no.05M, Day 13のErythrocyte	578	573
今井 繁 他5名	新キノロン系抗菌剤Fleroxacinのラットに おける経口投与による亜急性毒性試験	P157 左段下から1行目 右段上から9行目 P169 Table 12 Dose 1200mg/kg no of rats P172 Table 15 Dose 1200mg/kg no of rats	腺髄腫 脾臓 1 1	腺髄腫 脾臓 0 0
今井 繁 他6名	新キノロン系抗菌剤Fleroxacinのイヌにお ける経口投与による亜急性毒性試験	P181 Table 1-1	Table 1-2と ダブリ	下記に示す Table 1-1

Table 1-1. Hematological findings in male dogs orally treated with fleroxacin for 13 weeks

Week	Dose (mg/kg/day)	No. of dogs	Leucocytes ($\times 10^2/mm^3$)	Erythrocytes ($\times 10^4/mm^3$)	Platelets ($\times 10^4/mm^3$)	Hemoglobin (g/dl)	Hematocrit (%)	ESR (mm/h)
Before administration	control	4	99 ± 20	653 ± 38	19.1 ± 1.6	14.1 ± 0.3	45.2 ± 1.5	2.8 ± 2.2
	8	4	114 ± 49	596 ± 26*	27.3 ± 3.3*	13.8 ± 0.5	41.6 ± 1.5*	4.5 ± 4.5
	20	4	109 ± 10	598 ± 25	29.1 ± 8.5	13.6 ± 0.4	42.9 ± 2.2	3.3 ± 3.0
	50	4	91 ± 27	565 ± 5*	27.1 ± 11.9	13.0 ± 0.7*	41.8 ± 3.1	1.7 ± 1.0
6	control	4	92 ± 22	607 ± 27	34.0 ± 3.3	14.9 ± 0.8	44.4 ± 1.4	1.2 ± 0.8
	8	4	100 ± 16	598 ± 24	30.2 ± 2.4	15.3 ± 0.9	45.3 ± 0.9	0.5 ± 0.4
	20	4	96 ± 17	594 ± 36	32.9 ± 3.4	14.1 ± 1.0	43.7 ± 4.2	0.6 ± 0.4
	50	4	71 ± 12	665 ± 106	32.2 ± 5.7	13.7 ± 1.9	42.4 ± 8.0	1.5 ± 1.4
12	control	4	95 ± 11	645 ± 32	17.4 ± 1.6	15.8 ± 0.4	45.7 ± 2.9	0.8 ± 0.8
	8	4	95 ± 17	616 ± 38	14.7 ± 3.3	15.6 ± 0.9	46.5 ± 2.5	0.1 ± 0.1
	20	4	100 ± 17	615 ± 38	21.4 ± 5.0	14.7 ± 0.8*	46.0 ± 2.9	0.1 ± 0.0
	50	3	75 ± 7*	576 ± 58	21.2 ± 7.6	14.7 ± 1.4	42.7 ± 2.6	0.2 ± 0.1

* Significant difference from the control, $p < 0.05$

百々研次 郎 他8名	新キノロン系抗菌剤Fleroxacinの一般薬理 試験	P186 Table 6, 7 specific activity	U/g	U/mg
		P188, Table 8-2,9-2		
		189 Urobilinogen		(Ehrlich unit/dl)
		P190 Table 11	Tesis	Testis
		P192 Table 13 Dose 50mg/kg/day Lung right	4.870	4.810
		P214 右段上から12行目	10^{-5}	10^{-4}
		P233 Fig 25 fleroxacin, 300mg/kg p.o. 2h植	*	**

著者名	タイトル		該当箇所	誤	正	
原 三郎 他 2名	新キノロン系抗菌剤Fleroxacinの 抗原性試験	P242	左段上から17行目	10%	5%	
			左段上から18行目	50mg/body	25mg/body	
			左段上から21行目	10mg/body	5mg/body	
		P243	Table 1			
			FleroxacinのDose	50mg/body	25mg/body	
			OAのDose	10mg/body	5mg/body	
		P244	Table 2			
			FleroxacinのDose	50mg/body	25mg/body	
			OAのDose	10mg/body	5mg/body	
		P248	Table 8			
PCG-BGG, 100(μ g/body), PCG-HSA						
Immunization, twice	10/108(160)		10/10(160)			
坂本善生 他 1名	Fleroxacinの血中濃度と唾液中濃度	P339	Table 2			
			Non Fasting mean \pm SD	1.16	1.29	
		Time after administration (h) 1	0.92	1.12		
		P340	Table 4			
柴 孝也 他10名	健常人におけるFleroxacinの胃腸管吸収 に及ぼす制酸剤の影響	P346	Table 3			
			without Al(OH) ₃ , Time 24-48, fleroxacin(μ g/ml)	29.6	26.9	
宮北英司 他 4名	Fleroxacinにおける髄液移行と臨床的検討	P493	左段下から1行目	(男性9名, 女性4名,...	(男性10名, 女性3名,...	
			P494	Table 1		
		Patient no. 2 Age	28	59		
		Sex	F	M		
		Patient no. 3 Age	46	45		
		Patient no. 6 Age	78	58		
		Patient no.10 Sex	M	F		
Patient no.11 Sex	F	M				